

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ДОКТОР МОМ®

Регистрационный номер: П N015983/01

Торговое название
ДОКТОР МОМ®

Лекарственная форма
Сироп

Состав на 1 мл сиропа:

Активные вещества:

сухие экстракты, выделенные из:

Адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (Adhatoda vasika).....	6 мг
Алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (Aloe barbadensis).....	5 мг
Базилика священного листьев, семян и корней (Ocimum sanctum).....	10 мг
Девясила кистецветного корней (Inula racemosa).....	2 мг
Имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale).....	1 мг
Куркумы длинной корневищ (Curcuma longa).....	5 мг
Паслена индийского корней, плодов, семян (Solanum indicum).....	2 мг
Перца кубебы плодов (Piper cubeba).....	1 мг
Солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra).....	6 мг
Терминалии белерики плодов (Terminalia belerica).....	2 мг
Левоментол.....	0,6 мг

вспомогательные вещества: сахароза 750 мг, глицерол 50 мг, лимонной кислоты моногидрат 0,65 мг, натрия бензоат 3,5 мг, метилпарагидроксибензоат натрия 1 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 0,5 мг, сорбиновая кислота 0,5 мг, краситель ВQ Супра (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого) 0,6 мг, ароматизатор ананасовый 0,002 мл, вода очищенная до 1 мл.

Описание

Сироп темно-зеленого цвета с запахом ананаса.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ [R05CA10]

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой (фарингит, ларингит, в том числе, «лекторский», трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Детям: с 3 до 5 лет – по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в день;
с 6 до 14 лет – по 1/2–1 чайной ложке (2,5–5,0 мл) 3 раза в день.

Взрослым и детям старше 14 лет:
по 5,0–10,0 мл 3 раза в день.

Курс лечения – 2–3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Чувство тошноты и дискомфорта в брюшной полости. Аллергические реакции.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Особые указания

Если симптомы заболевания сохраняются или наблюдается ухудшение состояния, необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу.

Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе для взрослых (5,0–10,0 мл) содержится 3,75–7,50 г сахарозы, что соответствует 0,31–0,62 ХЕ.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. При случайном или преднамеренном проглатывании препарата ребенком следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности – не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Сироп. По 100 или 150 мл во флакон из полиэтилентерефталата зеленого цвета, укупороенный алюминиевой или пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон в комплекте с мерным стаканчиком из полипропилена (15 мл) и инструкцией по применению в картонную пачку.

По 100 или 150 мл во флакон из полиэтилентерефталата зеленого цвета, укупороенный пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:

Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.), Индия/ Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India

Фактический адрес производственной площадки:

Участок № 215-216 Г.И.Д.К. Индастриал Эриа, Паноли - 394 116, Округ:- Бхаруч, штат Гуджарат, Индия/ Plot No. 215-216 G.I.D.C. Industrial Area, Panoli - 394 116, Dist:- Bharuch, Gujarat state, India

Организация, принимающая претензии:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55.